Що е то Ротавирусен гастроентерит и как можем да се заразим ?

Ротавирусният гастроентерит е *възпаление на стомашно-чревната лигавица с причинител Ротавирус, който е най-честият инфекциозен агент, водещ до остро заболяване при деца между 6 месеца и 2 години.*

До 5-годишна възраст почти всички деца са били заразени поне веднъж с Ротавирус.

Ротавирусът е много издръжлив във външна среда. За развитието на инфекция са необходими съвсем малък брой вируси, тоест ротавирусът е силно заразен.

Безсимптомните заразоносители са също източник на инфекция.



Среща се през цялата година, но пик на заболяването се наблюдава през есенно-зимния сезон.

Инкубационният период е кратък (2-4 дни).

Фактите...

Ротавирусите причиняват тежко протичащи, гастроентерити с обезводняване в ранна детска възраст (6 мес.-2 год.), налагащи прием в болнично заведение.

В световен мащаб 30-40% от хоспитализациите по повод на остър гастроентерит при деца под 5-годишна възраст се дължат на ротавируси.

Ротавирусните гастроентерити са причина за около 450 000 смъртни случая годишно в света.

Това са 25% от всички смъртни случаи от диарийно заболяване и 6% от всички смъртни случаи при деца под 5-годишна възраст в световен мащаб.

Какви са симптомите ?

Симптоми при гастроентерит



Децата са най-уязвими към загуба на течности и електролити при многократното повръщане и диария (от 5 до 20 изхождания в денонощие).

Тези нарушения във водно-електролитния баланс и дехидратацията са най-честата причина за усложнения и смъртни случаи свързани с ротавирусния гастроентерит в световен мащаб.

А лечението?

Няма специфично лечение на ротавирусен гастроентерит. Лекуват се симптомите.

Решението ?

Ротавирусна ВАКСИНА

Най-ефективното средство за предпазване от тежко протичащи ротавирусни гастроентерити и за контрол над ротавирусните инфекции са ваксините.

От 2017 г. ваксините срещу ротавирусен гастроентерит в България се прилагат безплатно по национална програма.

В съответствие с Националната програма за профилактика на ротавирусните гастроентеирти се прилага:

•Ваксина в три дози на деца на възраст от 6 седмици до 32 седмици с интервал между приемите от 4 седмици.

•Ваксина в две дози на деца на възраст от 6 седмици до 24 седмици с интервал между приемите от 4 седмици.

Ваксините се поставят под формата на капки през устата от общопрактикуващите лекари, които са изпълнители по програмата.

Над 80 държави са включили ротавирусните ваксини в имунизационните си календари и ги прилагат широко, за да се предотвратят последващи инфекции и усложнения.

След въвеждането на ваксините хоспитализациите и смъртните случаи от ротавирусни гастроентерити са намалели значително.

Можете да предпазите Вашето дете от ротавирусен гастроентерит и неговите усложнения чрез ваксинация.



Издава

РЗИ-Сливен по НП за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022-2025 г.



Ротавирус

